

*Tome apixabán  
exactamente  
como se le  
recetó, a la  
misma hora  
todos los días.*

## Apixabán (Eliquis)

Apixabán (Eliquis®) es un medicamento que previene la formación de coágulos en la sangre. Se conoce como anticoagulante o “diluyente de la sangre”. En realidad, el apixabán no diluye la sangre. Previene la formación de nuevos coágulos o que los coágulos existentes se vuelvan más grandes y provoquen problemas más graves.

El apixabán no disuelve los coágulos que ya se han formado. Se utiliza para prevenir o tratar la coagulación dañina relacionada con algunas afecciones de los vasos sanguíneos, o del corazón y los pulmones.

### Dosificación y administración

Su médico o farmacéutico selecciona la dosis correcta de apixabán dependiendo de su edad, peso y qué tan bien funcionan sus riñones, así como otros medicamentos que usted toma.

Debe tomar las tabletas de apixabán con comida para dejar que su cuerpo lo absorba.

Tome apixabán **exactamente como se le recetó**, a la misma hora todos los días. No deje de tomar apixabán a menos que su médico se lo indique.

No se quede sin apixabán. Surta nuevamente su receta antes de que se le acabe. Los efectos del apixabán que combaten los coágulos comienzan a dejar de tener efecto en más o menos 24 horas.

### Olvido de una dosis

Si olvidó tomar una dosis de apixabán, tómela tan pronto lo recuerde, a menos que esté cerca de su próxima dosis. Si han pasado más de 6 horas desde la hora habitual en la que toma su dosis, omita la dosis que olvidó y espere para tomar la siguiente dosis a la hora programada normalmente. De esta manera, evitará tomar una dosis doble o adicional. Luego, vuelva a su dosis regular programada.

### Alcohol

No consuma alcohol mientras toma apixabán. Consumir alcohol puede aumentar el riesgo de sangrado en su estómago e intestinos.

## Interacciones entre medicamentos y productos herbales

Algunos medicamentos de venta libre (OTC, en inglés) sin receta médica pueden aumentar o disminuir el efecto del apixabán. Es importante que hable con su médico o farmacéutico antes de usar aspirina u otros medicamentos para el dolor conocidos como medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID, en inglés). Cuando compre un analgésico, lea siempre los ingredientes de la etiqueta y pida la asesoría de su médico, enfermero o farmacéutico si no está seguro de su contenido. Para la mayoría de los pacientes, acetaminofén (Tylenol®) es el analgésico de venta libre preferente.

No use los siguientes medicamentos de venta libre comunes:

Medicamentos que contienen Aspirina	Antiinflamatorios no esteroideos
▪ Excedrin®	▪ Ibuprofeno (Advil®, Midol®)
▪ Anacin®	▪ Naproxeno (Aleve®)
▪ Bufferin®	

No use medicamentos para el resfriado o la sinusitis, laxantes y antiácidos que contengan aspirina o antiinflamatorios no esteroideos.

## Sangrado y qué hacer si sangra

El apixabán puede aumentar su riesgo de sangrado y hematomas. Tenga cuidado cuando realice actividades que puedan ocasionar lesiones, un corte o un hematoma.

- Informe a su médico si se cae, se golpea el cuerpo o la cabeza o sobre cualquier otra lesión.
- Coloque una alfombra de baño antideslizante en la tina para evitar accidentes.
- Tenga cuidado de no cortarse. Eso incluye tener un cuidado especial al cepillarse los dientes y al afeitarse. Use un cepillo de dientes blando y seda dental con cuidado. Use una rasuradora eléctrica, en lugar de una afeitadora manual con hojas de afeitar.
- Si se corta, aplique presión sobre el área durante 5 minutos para asegurarse de detener el sangrado.
- Es importante que porte una identificación, como un brazalete de alerta médica, indicando que toma apixabán. Esto puede ayudarlo a recibir un tratamiento adecuado en caso de una emergencia.

## Cuándo debe llamar al médico

Llame a su médico de inmediato o diríjase a un departamento de emergencias si ocurre algo de lo siguiente:

### **Señales de sangrado:**

- Sangrado incontrolable por cortes o heridas
- Hemorragia nasal que ocurre a menudo o incontrolable
- Tos con sangre

- Orina roja, rosada o marrón
- Vómito con sangre o que parece granos de café
- Heces rojas brillantes o negras que parecen brea (si no está tomando suplementos de hierro)
- Sangrado excesivo en las encías o incontrolable
- Moretones anormales o cambios en el color de la piel que aumenta o que no mejora con el tiempo
- Mareos o desmayos
- Malestar estomacal o intestinal
- Dolores de cabeza que no se van
- Sangrado menstrual abundante que es incluso más abundante de lo usual

***Señales de coágulos:***

- Dificultad para respirar
- Dolor en el pecho
- Mareos
- Falta de aire
- Hinchazón o enrojecimiento en las piernas o los brazos
- Dolor cuando camina, o dolor y calor en brazos o piernas

Haga preguntas para asegurarse de entender qué cantidad de apixabán debe tomar y cuándo tomarlo. Llame al médico si tiene preguntas.