

*Tome Truvada
exactamente
como se le
recetó, a la
misma hora
todos los días.*

Truvada

Truvada® es un medicamento que se usa para tratar el virus de inmunodeficiencia humana (VIH, o HIV, en inglés) o reducir el riesgo de contraer VIH. Es una combinación de 2 medicamentos: emtricitabina y fumarato de disoproxilo de tenofovir.

Dosificación y administración

Su médico y farmacéutico decidirán qué tanto y qué tan a menudo debe tomar Truvada. Esto se basará en qué tan bien funcionan sus riñones. Tome Truvada exactamente como se le recetó, a la misma hora todos los días.

Tome Truvada con un vaso de agua lleno. Se puede tomar con o sin alimentos.

No deje de tomar Truvada hasta que su médico se lo indique. Surta nuevamente su receta antes de que se le acabe.

Olvido de una dosis

Es importante que no se olvide de ninguna de las dosis de su medicamento. Olvidar una dosis aumentará el riesgo de contraer VIH o de volverse resistente a Truvada (lo que significa que el medicamento no funcionará tan bien).

Si olvida una dosis de su medicamento, tómelo tan pronto como lo recuerde, a menos que casi sea la hora de tomar su próxima dosis. Si su próxima dosis está cerca, omita la dosis que olvidó y continúe a la hora programada. Nunca tome una dosis adicional o doble de su medicamento.

Interacciones entre medicamentos

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que toma en casa, incluidos otros medicamentos con receta, medicamentos de venta libre y productos herbales. Algunos de estos pudieran afectar el funcionamiento de Truvada.

Efectos secundarios

Truvada puede causar lo siguiente:

- Diarrea
- Náuseas
- Mareos
- Dolor de cabeza
- Decoloración de la piel de las manos y pies

Cuándo debe llamar al médico

Llame a su médico de inmediato si se presenta alguno de los siguientes síntomas:

- Reacciones alérgicas, incluido sarpullido, urticaria, picazón o hinchazón de los labios, la lengua o la cara
- Problemas para respirar
- Pérdida del apetito
- Dolor en el cuerpo o los músculos
- Debilidad o cansancio inusuales

Si tiene alguna pregunta, consulte a su médico o farmacéutico.