

## Centro de Salud Digestiva

### INSTRUCCIONES PARA PH-IMPEDANCIA

Fecha de la cita: \_\_\_\_\_ Hora de llegada: \_\_\_\_\_

Ubicación: 259 E. Erie St, Lavin Pavilion, piso 16

Para programar, reprogramar o cancelar, llame al 312.695.5620

#### **Acerca de la Prueba pH-Impedancia**

El propósito de esta prueba es analizar la cantidad de exposición de ácido que se dirige al esófago en un período de 24 horas. Para hacerlo, se introduce un pequeño catéter con dos sensores de pH al esófago. El primer beneficio del estudio de pH es que su médico podrá documentar el nivel y duración en que el esófago está expuesto al ácido estomacal.

#### **Seguro**

Para evitar cargos inesperados, verifique con su seguro médico los beneficios, la cobertura y las ubicaciones/proveedores de preferencia para este procedimiento. Podrá encontrar a continuación los códigos de procedimiento y diagnóstico.

Código de Procedimiento (CPT): 91038      Código de Diagnóstico (ICD-10): \_\_\_\_\_

Nuestro departamento asistirá en obtener la certificación/autorización previa si así lo requiere su seguro médico. Por favor, llame a la compañía tres días antes de su procedimiento para verificar que ha recibido la autorización. Si su procedimiento no ha sido aprobado, llame al departamento de certificación previa al 312-926-3041.

#### **Preparación**

- Si su prueba está programada para la mañana, no debe comer o beber antes de la medianoche de la noche anterior a la prueba.
- Si la prueba está programada para la tarde, no debe comer o beber seis horas antes de la prueba.

- Consulte con su médico si debe dejar de tomar alguno de sus medicamentos GI/para reducir el ácido. Este estudio puede realizarse con o sin los PPI (supresores de ácido gástrico).

### **Durante el estudio:**

El estudio del pH toma aproximadamente 1 minuto para insertar el tubo pH, 15 minutos para darle las instrucciones al paciente y 24 horas para completar el estudio. El técnico GI le explicará la prueba y le hará una serie de preguntas relacionadas a los síntomas GI que está teniendo. Se pasará cuidadosamente un tubo delgado y suave llamado catéter de pH por la nariz, pasando la garganta, por el esófago hacia el estómago. Un sensor de pH va en el estómago y el otro reposa 5 centímetros arriba del esfínter esofágico inferior (EEI). Una vez que el catéter esté en su lugar, el técnico asegurará el catéter a la nariz y alrededor del oído con cinta.

Una vez que el estudio comience, se conectará el catéter a un dispositivo de grabación. Para evitar que el equipo se moje, no podrá ducharse en las siguientes 24 horas. Además, será responsable de llevar un diario y anotar cuando come, se acuesta y sucedan los síntomas. Regresará al laboratorio de GI para que le retiren el catéter 24 horas después.

### **Luego de la Prueba pH-Impedancia**

- Cuando haya concluido con esta prueba, puede resumir sus actividades normales y tomar sus medicamentos.
- Si no recibe los resultados por teléfono o MyChart en 7-10 días hábiles, llame al consultorio médico.