

Centro de Salud Digestiva

INSTRUCCIONES PARA LA ENDOSCOPIA SUPERIOR (EGD)

Fecha de Cita: _____ Hora de Llegada: _____

**Planifique pasar de 2.5 a 3 horas en el laboratorio GI

Médico: _____

- Ubicación 259 E Erie St, Lavin Pavilion, piso 16, Chicago, IL
 675 N Saint Clair St, Galter Pavilion, piso 4, Chicago, IL

Por favor, conserve su cita original. Si necesita reprogramar su procedimiento, DEBE avisar con al menos 7 días de antelación.

Para la programación, llame al: 312.926.0628

Para inquietudes o preguntas clínicas, llame al: 312.695.5620

Preparación para el Procedimiento

7 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- Si toma anticoagulantes (Coumadin, Plavix, Eliquis, etc.) que no sean aspirina, por favor comuníquese con el médico que lo recetó **al menos 2 semanas antes de su procedimiento** para discutir cuanto tiempo debe dejar de tomar o cómo manejar sus anticoagulantes antes de su procedimiento. Puede seguir tomando aspirina.
- Si toma un **medicamento para la diabetes**, comuníquese con el médico que le receta para hablar sobre un ajuste en la dosis para evitar bajo niveles de azúcar en sangre.

3 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- Por favor, comuníquese con la compañía de su seguro médico para verificar la cobertura y si tendrá que pagar algún costo por desembolso directo o requisitos de certificación previa. Revise la sección de seguro médico/facturación en este documento para obtener más información.
- Planifique el transporte usando la sección de transporte y estacionamiento en este documento.
- Puede completar los formularios de procedimiento previo de antemano visitando:
<https://www.nm.org/conditions-and-care-areas/digestive-health>.

- Desplace la página hacia abajo y ubique Recursos Relacionados. Seleccione “GI Lab Patient Questionnaire and Medication List” (Cuestionario del paciente del laboratorio GI y lista de medicamentos).

Medicamentos

- Si está tomando un **anticoagulante** (Coumadin, Plavix, Eliquis, etc.) que no sea aspirina, por favor comuníquese con el médico que lo recetó **al menos 2 semanas antes de su procedimiento** para discutir cuanto tiempo debe dejar de tomar o cómo manejar sus anticoagulantes antes de su procedimiento. Puede continuar tomando aspirina.
 - NO espere hasta el día antes del procedimiento para tener esta conversación, ya que se deben dejar de tomar ciertos anticoagulantes varios días antes del procedimiento.
 - Está bien continuar tomando Aspirina, NSAID y aceite de pescado.
- Si toma un **medicamento para la diabetes**, comuníquese con el médico que le receta para hablar sobre un ajuste en la dosis para evitar bajo niveles de azúcar en sangre.
 - Si su procedimiento está programado **con anestesia** y está tomando uno de estos medicamentos, no tome una dosis antes del procedimiento (un día si se toma diariamente, una semana si se toma semanalmente) comuníquese con su proveedor gastrointestinal si tiene más preguntas.
 - Liraglutida (Saxenda o Victoza), Dulaglutida (Trulicity), Exenatida (Byetta), Lixisenatida (Adlyxin), Mounjaro (Tirzepatida), Semaglutida (Ozempic, Wegovy o Rybelsus), Exenatide de liberación prolongada (Bydureon bcise)
- Puede tomar los demás medicamentos hasta 4 horas antes de la hora de llegada.

EL DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- Instrucciones Alimenticias del Procedimiento Lavin ○ **Procedimientos por la Mañana:** No ingiera ningún alimento sólido después de medianoche.
 - **Procedimientos por la Tarde:** Puede desayunar LIGERAMENTE (tostada, muffin, fruta) siempre y cuando sea 6 horas antes de la hora de llegada.
 - Debe tomar cualquier otro líquido que no sea agua más de 6 horas antes de la hora de llegada.
 - Puede tomar agua hasta 4 horas antes de la hora de llegada establecida.

- Instrucciones Alimenticias del Procedimiento Galter ○ **Procedimientos por la Mañana y por la Tarde:** No ingerir alimentos después de medianoche. Esto incluye caramelos y mentas.
 - Puede tomar agua hasta 4 horas antes de la hora de llegada establecida.
- Puede tomar sus medicamentos matutinos hasta 4 horas antes de la hora de llegada establecida.
- Traiga una identificación con foto y la tarjeta del seguro médico.
- Recomendamos dejar las cosas de valor en casa o entregárselas a un familiar o amistad de confianza.
- Si usa algún inhalador o una máquina CPAP, tráigalos al procedimiento.

Transporte y Estacionamiento

- Debido a los efectos prolongados del sedante, **DEBE** tener a un adulto de confianza y capaz para acompañarlo a casa al momento de darle de alta. Su procedimiento será cancelado si no tiene a un acompañante.
- No puede tomar un Taxi, Uber o un transporte público por sí mismo; debe tener a un adulto de confianza y capaz con usted.
- NO podrá regresar a trabajar después del procedimiento.
- El estacionamiento para la ubicación de Lavin está disponible dentro del edificio Lavin ubicado en 259 E. Erie Street, el cual es accesible de tanto desde Erie St. como de Ontario St. Traiga con usted el ticket de estacionamiento al laboratorio GI para su validación y recibir un descuento en la tarifa de estacionamiento.
- El estacionamiento de Galter Pavilion está ubicado en 222 E. Huron Street. Use el puente del segundo piso para acceder Galter Pavilion.
- Para más información sobre la ubicación de los garajes de los estacionamientos, tarifas de estacionamiento y un mapa, visite www.nm.org.

Seguro Médico y Facturación

Para evitar cargos inesperados, verifique con su seguro médico los beneficios, la cobertura y las ubicaciones/proveedores de preferencia para este procedimiento. Por favor, use los siguientes códigos específicos como referencia.

Código de Procedimiento EGD (CPT) : 43235

Códigos de Diagnóstico EGD (ICD-10): _____

Autorización Previa

Nuestro departamento de autorización previa consultará con su plan de seguro médico para confirmar si necesitan una autorización previa y esta será completada si así lo requiere su plan.

- Sin embargo, tenga en cuenta que una autorización previa **no garantiza** el pago y **no significa** que no tendrá costos por desembolso directo luego de que su seguro médico haya pagado. Para averiguar si usted tendrá que pagar algo por desembolso directo, llame a su seguro médico y use los códigos proporcionados.
- Llame a su seguro médico 3 días antes de su procedimiento para verificar que la autorización ha sido recibida (**Medicare y Medicaid tradicional no requieren autorización previa**).
- Si su procedimiento no ha sido aprobado, llame al departamento de certificación previa al 312.926.3041.

Descargo de responsabilidad: Este formulario no garantiza cobertura. No autoriza el pago por los servicios, incluidos servicios o procedimientos fuera de la red para los cuales el paciente no tiene cobertura.

Información de Contacto

****Por favor, revise este documento y vea la sección de Preguntas frecuentes antes de llamar a nuestra oficina ya que es posible que haya preguntas que tengan la respuesta en este documento.**

Clínica: 312.695.5620

Programación del procedimiento: 312.926.0628

Certificación previa: 312.926.4645

Facturación: 844.669.2455

Asesoría financiera/estimado de precios: 312.926.6906

Medi-Car: 312.926.5988

Hospital: 312.926.9000

Registros médicos: 312.926.3375 Fax

de Digestive Health: 312.695.7095

dhc.nm.org

- Si está amamantando, debe continuarlo una vez esté despierta, estable y alerta después del procedimiento, a menos que su médico le indique lo contrario.

6. ¿Sentiré malestar después del procedimiento?

- Por lo general, no, sin embargo, algunas personas llegan a sentir una leve inflamación en la garganta luego del procedimiento, pero debería ser tolerable y debe disiparse luego de 1-2 días. Por favor, llámenos a la oficina o vaya a la sala de emergencia en caso de tener algún síntoma grave o intolerable.

7. ¿Qué puedo esperar en términos de recuperación?

- El sedante utilizado durante su procedimiento le ayudará a sentirse relajado y calmado. Existe la posibilidad que recuerde parte de su procedimiento, pero a muchos no les pasa así. Luego de su procedimiento, puede sentirse débil, cansado o inestable al estar de pie. Es posible que también tenga problemas de concentración o pérdida de memoria a corto plazo, pero estos síntomas deben desaparecer en 12 a 24 horas. Por estos motivos, no maneje, tome decisiones importantes, beba alcohol, opere maquinaria o regrese al trabajo el resto del día. Le recomendamos enfáticamente que regrese a casa y descance. Puede retomar la actividad normal al día siguiente a menos que su médico le indique lo contrario.