

Tome este medicamento exactamente según lo recetado, a la misma hora todos los días.

Dolutegravir (Tivicay®)

Dolutegravir es un medicamento que se utiliza para tratar el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o reducir el riesgo de contraer el VIH. Este medicamento siempre se utiliza en combinación con otros medicamentos y nunca debe tomarse solo.

Posología y administración

Dolutegravir se toma una vez al día. Tome este medicamento a la misma hora todos los días, a intervalos regulares.

Puede tomar este medicamento con o sin alimentos. Tome este medicamento con un vaso lleno de agua.

Olvido de una dosis

Es importante no olvidar ninguna dosis de su medicamento, ya que esto aumentará el riesgo de contraer el VIH o generar resistencia a este medicamento.

Si olvida tomar una dosis de su medicamento, tómela apenas lo recuerde, a menos que esté por cumplirse la hora de su próxima dosis. Si se acerca la hora de su próxima dosis, omita la dosis que olvidó y siga el horario programado. Nunca tome una dosis doble o extra de su medicamento.

Interacciones medicamentosas

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que toma en casa, incluidos otros medicamentos recetados, medicamentos de venta libre, hierbas o suplementos.

Dolutegravir interactúa con varios suplementos de venta libre, como calcio, magnesio y hierro. Informe a su farmacéutico y a su médico si toma alguno de estos medicamentos para que le indique cómo manejar esta interacción.

Efectos secundarios

Dolutegravir puede causar lo siguiente:

- Diarrea
- Náuseas
- Vómitos
- Mareos
- Dolor de cabeza
- Problemas para dormir

Informe a su médico si tiene diabetes, ya que dolutegravir puede aumentar los niveles de azúcar en sangre.

Cuándo llamar a su médico

Llame a su médico si se presenta alguno de los siguientes síntomas:

- Reacción alérgica, que incluye erupción cutánea, urticaria, picazón, o hinchazón de los labios, la lengua o la cara
- Cambios de humor o cambios en el comportamiento
- Fiebre o escalofríos