

Raltegravir (Isentress®)

Raltegravir es un medicamento que se usa ya sea para tratar el virus de inmunodeficiencia humana (HIV, por sus siglas en inglés) o para reducir el riesgo de contraer el HIV. Este medicamento siempre es tomado en combinación con otros medicamentos y nunca debe ser tomado por sí solo.

Tome este medicamento exactamente como se le recetó, a la misma hora todos los días.

Dosificación y administración

Tome raltegravir dos veces al día, con más o menos 12 horas de separación. Tome este medicamento a la misma hora todos los días en intervalos regulares.

Puede tomar este medicamento con o sin comida. Tome este medicamento con un vaso de agua lleno. No mueva, corte ni mastique este medicamento.

Olvido de dosis

Es importante que no se olvide de ninguna de las dosis de su medicamento. Olvidarse de una dosis aumentará su riesgo de contraer HIV o de volverse resistente a este medicamento.

Si olvida una dosis de su medicamento, tómelo tan pronto como lo recuerde, a menos que casi sea la hora de tomar su próxima dosis. Si su próxima dosis está cerca, omita la dosis que olvidó y continúe a la hora programada. Nunca tome una dosis extra o doble de su medicamento.

Interacciones entre medicamentos

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que toma en casa. Esto incluye otros medicamentos con receta, medicamentos de venta libre, productos herbales o suplementos. Algunos de estos puede interactuar con su medicamento.

Raltegravir interactúa con muchos de los medicamentos de venta libre usados para tratar problemas estomacales, como acidez o enfermedad de reflujo gastroesofágico (GERD, por sus siglas en inglés). Algunos de estos medicamentos incluyen:

- Omeprazol (Prilosec®, otros)
- Pantoprazol (Protonix®)
- Lansoprazol (Prevacid®, otros)
- Carbonato de calcio (Tums®)
- Hidróxido de aluminio (Maalox®)

Infórmele a su farmacéutico y a su médico si toma cualquiera de estos medicamentos, u otros medicamentos para reducir la acidez estomacal. Ellos le dirán cómo manejar esta interacción.

Efectos secundarios

Raltegravir puede causar lo siguiente:

- Diarrea
- Náuseas
- Vómitos
- Mareos
- Dolor de cabeza
- Problemas para dormir

Cuándo debe llamar al médico

Llame a su médico de inmediato si se presenta alguno de los siguientes síntomas:

- Reacción alérgica, incluido sarpullido, urticaria, picazón o hinchazón de los labios, lengua o cara
- Problemas para respirar
- Cambios en el ánimo o cambios conductuales
- Dolores musculares
- Fiebre o escalofríos
- Orina de color oscuro

Northwestern Medicine – Recursos de Información Médica

Para obtener información, comuníquese con Alberto Culver Health Learning Center (HLC) de Northwestern Memorial Hospital en hlc@nm.org, o llame al 312.926.5465. Los profesionales de información médica pueden ayudarle a buscar la información que necesite y proporcionarle ayuda personalizada sin cargo.

Para obtener información adicional sobre Northwestern Medicine, visite nuestro sitio web en nm.org.