

## Terapia de Bumetanida (Bumex®) Intravenosa

Bumetanida es un medicamento que se utiliza para tratar los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Con la insuficiencia cardíaca, el corazón no puede bombear la sangre tan bien como debiera. Eso hace que el líquido regrese a los pulmones y a algunas partes del cuerpo.

La bumetanida es un medicamento diurético (pastilla para eliminar el agua) que ayuda a eliminar el sodio (sal) y agua adicional del cuerpo. Ayuda a los riñones a hacer más orina. Cuando se elimina el líquido adicional, su corazón puede bombear mejor.

*Si tiene alguna consulta, hable con su médico o enfermero.*

### Cómo recibir bumetanida en la clínica

La bumetanida puede darse como píldora por la boca o como una inyección en una vena (IV). Cuando se administra por vía intravenosa, funciona mejor para eliminar el líquido con más rapidez. Durante su visita clínica, es posible que el médico decida que esta terapia le ayudará.

El enfermero preparará el medicamento en una jeringa. Luego se le inyectará lentamente en una vena mediante una aguja pequeña.

Sentirá la necesidad de orinar minutos después de que se le administre el medicamento. Es posible que necesite orinar varias veces las próximas horas a medida que el cuerpo elimina el líquido.

Después de recibir el medicamento, le pediremos que permanezca sentado en el área de espera de la clínica hasta que orine y se sienta cómodo de regresar a casa de manera segura.

### Efectos secundarios de la bumetanida

Puesto que este medicamento elimina líquido adicional del cuerpo, es posible que experimente los siguientes síntomas:

- Mareos
- Aturdimiento
- Debilidad
- Calambres musculares o dolor de piernas

- Boca seca
- Aumento de la sed
- Zumbido en los oídos o pérdida auditiva

## **En casa**

### ***Lleve un registro***

Es importante llevar un registro escrito en casa para que le ayude a advertir los cambios.

- Registre su presión arterial todos los días.
- Registre su peso. Pésese todos los días al levantarse, después de usar el baño y antes de comer o beber.

### ***Vigile su dieta***

- Limite su consumo de sodio (sal) a 2,000 mg o menos todos los días.
- Limite su consumo de líquidos a 48 onzas (aprox. 1 1/2 litros) al día. Eso incluye alimentos no sólidos como sopas, paletas, gelatina, yogur y helados.

### ***Conozca los síntomas de la insuficiencia cardíaca***

Utilice la guía ***Zona de Insuficiencia Cardíaca*** para ayudarle a controlar sus síntomas.

Llame a la clínica al 312.695.4965 si advierte alguna de las siguientes opciones:

- Aumento de 2 libras o más en 1 día o 5 libras o más en 1 semana
- Inflamación de los pies, piernas o abdomen
- Aumento de la falta de aire
- Nuevo inicio de la tos
- Mareo al pararse o sentarse
- Frecuencia cardíaca acelerada o irregular
- Dolor de pecho que se alivia

### ***Llame al 911 o vaya directamente a la Unidad de Emergencias si experimenta:***

- Falta de aire intensa y constante
- Desmayo o “desvanecimiento”
- Dolor de pecho que persiste o molestias que no se alivian con nitroglicerina y que dura más de 15 minutos
- Confusión o dificultad para pensar
- Signos de una reacción alérgica a la bumetanida como:
  - Hinchazón de la lengua o cara
  - Nuevo sarpullido
  - Sentir como si la garganta se cierra

## Para obtener más información

Póngase en contacto con nosotros si tiene preguntas, consultas o desea solicitar materiales adicionales:

Northwestern Medicine Bluhm Cardiovascular Institute  
675 North Saint Clair Street  
Galter Pavilion, Suite 19-100  
Chicago, Illinois 60611  
312.695.4965

### ***Recursos en internet***

Northwestern Medicine Bluhm Cardiovascular Institute **heart.nm.org**

American Heart Association (AHA) **heart.org**

American College of Cardiology **cardiosmart.org**

### Registro de peso, presión arterial y síntomas

Fecha	Peso	Presión arterial	¿Cómo se siente? ¿Síntomas?	Medidas tomadas (como llamar al médico)