

Si tiene alguna duda o inquietud, por favor pregunte a su médico o enfermero(a)

Prueba de Mesa Basculante en Posición Vertical

Su médico sugirió que se practicara una prueba de mesa basculante en posición vertical. Cada persona tiene receptores en el corazón que ayudan a controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Algunas veces estos receptores se detonan en el momento equivocado. Esto puede evitar que el corazón lata rápido y lo suficientemente fuerte para suministrar la cantidad adecuada de sangre al cerebro. La disminución en el suministro de sangre lo puede hacer sentir aturdido, mareado o sudoroso. Hasta es posible que se desmaye. Esta sensación de “desvanecimiento” o desmayo se denomina síncope. Una prueba de mesa basculante ayuda a su médico a saber por qué usted se está desmayando y cómo debe tratarlo.

Preparación

En el hogar:

- No coma ni beba nada durante 6 horas antes de la prueba.
- Tome sus medicamentos habituales con pequeños sorbos de agua, a menos que se le indique lo contrario.
- Utilice ropa y zapatos cómodos (no use tacones) para la prueba.

Día de la prueba

El día de su prueba, llegue a Galter Pavilion, 251 East Huron Street. Tome los ascensores para visitantes al 8º Piso y vaya la Recepción cerca de los ascensores para registrarse. La persona en la recepción nos informará que usted llegó. Puede estacionarse en la cochera del estacionamiento del Northwestern Memorial, que se encuentra frente al hospital en 222 East Huron Street. Para obtener la validación, traiga consigo su boleto.

Si usted cambia o cancela su prueba, por favor llame al 312.695.4965 lo antes posible.

Procedimiento

La prueba de mesa basculante se realiza en el Electrophysiology Lab (Laboratorio de Electrofisiología).

En el hospital usted:

- Se colocará una bata para la prueba (puede dejarse puesta la ropa interior).
- Se le colocará una línea intravenosa (en la vena) en su brazo.
- Se le monitoreará su presión arterial y frecuencia cardíaca.

Usted se acostará sobre una mesa que tiene una almohada y una correa de seguridad.

Ésta se elevará de una posición

horizontal a una posición vertical. Usted permanecerá en una posición vertical de 40 a 60 minutos. Si se siente mareado o tiene una sensación de desmayo, su presión arterial y ritmo cardíaco serán registrados. La mesa regresará a la posición horizontal y habrá concluido la prueba.

Si se notan mareos, aturdimiento o desmayo durante la prueba, posiblemente se le suministre un medicamento oral. La prueba se puede repetir en 1 ó 2 semanas para ver si el medicamento está funcionando.

Después de la prueba

Se retirarán la línea intravenosa y el monitor cardíaco. Usted podrá reanudar su actividad y dieta normales.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con los enfermeros de Electrofisiología al 312.695.4965.



Las entidades que conforman Northwestern Medicine están comprometidas a representar a las comunidades que atendemos promoviendo una cultura de inclusión, brindando atención culturalmente competente y acceso a tratamiento y programas sin discriminación y eliminando todas las disparidades en la atención médica. Si tiene alguna pregunta, llame al Patient Representatives Department (Departamento de Representantes de los Pacientes) del Northwestern Memorial Hospital al 312.926.3112, TDD/TTY 312.926.6363, o al Patient Representatives Department (Departamento de Representantes de los Pacientes) del Northwestern Medical Group al 312.695.1100, TDD/TTY 312.926.6363.

Desarrollado por: NMH Personal de Electrophysiology Nursing (Enfermería de Electrofisiología)