

*Tome este medicamento exactamente como se le recetó, a la misma hora todos los días.*

## **Truvada**

Truvada® es un medicamento que se usa para tratar el virus de inmunodeficiencia humana (HIV, por sus siglas en inglés) o reducir el riesgo de contraer el HIV. Es una combinación de 2 medicamentos: emtricitabina y fumarato de disoproxilo de tenofovir.

### **Dosificación y administración**

Su médico y farmacéutico decidirán que tanto y qué tan a menudo debe tomar Truvada. Esto se basará en qué tan bien funcionan sus riñones. Tome Truvada exactamente como se le recetó, a la misma hora todos los días.

Truvada se puede tomar con o sin alimentos. Tome este medicamento con un vaso de agua lleno.

No deje de tomar Truvada hasta que su médico se lo indique. Surta nuevamente su receta antes de que se le acabe.

### **Olvido de una dosis**

Es importante que no se olvide de ninguna de las dosis de su medicamento. Olvidarse de una dosis aumentará su riesgo de contraer HIV o de volverse resistente a Truvada (lo que significa que el medicamento no será tan efectivo).

Si olvida una dosis de su medicamento, tómelo tan pronto como lo recuerde, a menos que casi sea la hora de tomar su próxima dosis. Si su próxima dosis está cerca, omita la dosis que olvidó y continúe a la hora programada. Nunca tome una dosis extra o doble de su medicamento.

### **Interacciones entre medicamentos**

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que toma en casa, incluidos otros medicamentos con receta, medicamentos de venta libre, productos herbales o suplementos. Algunos de estos puede interactuar con Truvada.

## Efectos secundarios

Truvada puede causar lo siguiente:

- Diarrea
- Náuseas
- Mareos
- Dolor de cabeza
- Decoloración de la piel de las manos y pies

## Cuándo debe llamar al médico

Llame a su médico de inmediato si se presenta alguno de los siguientes síntomas:

- Reacciones alérgicas, incluido sarpullido, urticaria, picazón o hinchazón de los labios, lengua o cara
- Problemas para respirar
- Síntomas similares a la gripe
- Pérdida del apetito
- Debilidad o cansancio inusuales

Si tiene alguna pregunta, consulte a su médico o farmacéutico.