

Si tiene alguna pregunta, consulte a su médico o enfermero.

Sedación Moderada en Radiología de Intervención

La sedación moderada es una opción segura y eficaz para los pacientes a los que se les practica una cirugía menor o estudios médicos. Durante el procedimiento se administran medicamentos para calmar el dolor, el miedo y la ansiedad. El objetivo es dar comodidad y una recuperación segura y rápida.

¿Qué sucede durante la sedación moderada?

En el área de preparación se le colocará una vía intravenosa en el brazo o mano. Luego, lo llevarán a la sala del procedimiento y lo colocarán en la mesa del procedimiento de forma segura. La enfermera lo conectará a un monitor cardíaco, una pulsera de presión arterial y un medidor en el dedo que monitorea sus niveles de oxígeno. Una sonda con oxígeno se puede colocar debajo de su nariz. A través de la línea intravenosa se le inyectará un medicamento para relajarlo. Su equipo de atención médica lo cuidará y monitoreará sus signos vitales y estado de alerta, durante y después del procedimiento.

¿Cómo me sentiré?

Durante el procedimiento, es posible que se sienta adormecido, pero estará despierto y podrá hablar. Se inyecta un anestésico en el lugar del procedimiento. Esto le hará sentir una sensación de quemazón o un pinchazo como una picada de abeja. Podrá sentir calor, frío y presión, pero no tendrá sensaciones agudas después de que se administre el anestésico. El equipo de atención médica hablará con usted sobre cómo se siente y lo mantendrá cómodo durante el procedimiento.

Después del procedimiento, es posible que tenga los siguientes efectos secundarios hasta por 24 horas:

- Algún o ningún recuerdo de lo que sucedió durante el procedimiento
- Dolor de cabeza
- Náuseas, vómitos o boca seca
- Somnolencia
- Sentirse aturdido o mareado

Si los efectos secundarios no mejoran o empeoran, póngase en contacto con su médico o vaya a la sala de emergencias más cercana. Si tiene alguna pregunta sobre la sedación moderada o sobre su procedimiento, hable con su médico o enfermero.

¿Qué sucede después del procedimiento?

La mayoría de los pacientes se recupera en una hora después de que se les suministró la sedación moderada. En algunos casos, el tiempo de recuperación puede llegar a 6 horas. Durante ese período, una enfermera lo revisará con frecuencia. Un amigo o familiar de al menos 18 años de edad debe acompañarlo a casa. No puede conducir durante 24 horas después de recibir sedación. Sugerimos que esta persona permanezca con usted durante las próximas 6 horas.

El enfermero comentará el cuidado necesario en el hogar con usted y su familiar o amigo. Incluye lo siguiente:

- Descanse hoy.
- No conduzca ni opere maquinaria durante 24 horas.
- No tome decisiones importantes durante 24 horas.
- No tomar bebidas alcohólicas por lo menos durante 24 horas.
- No tomar otros relajantes musculares ni medicamentos sedantes, hipnóticos o que alteren el estado de ánimo por lo menos durante 24 horas, a menos que se lo indique su médico.

Northwestern Medicine – Recursos de Información Médica

Para obtener información, comuníquese al Alberto Culver Health Learning Center (HLC) de Northwestern Memorial Hospital en hlc@nm.org, o llame al 312.926.5465. Los profesionales de información médica pueden ayudarle a buscar la información que necesite y proporcionarle ayuda personalizada sin cargo.

Para obtener información adicional sobre Northwestern Medicine, visite nuestro sitio web, en nm.org.

Para obtener ayuda en español, llame al Departamento de Representantes de los Pacientes al 312.926.3112.

Las entidades que conforman Northwestern Medicine están comprometidas a representar a las comunidades que atendemos, fomentando una cultura de inclusión, brindando atención culturalmente competente, proporcionando acceso a tratamientos y programas sin discriminación, y eliminando las desigualdades en la atención médica. Si tiene alguna pregunta, llame al Departamento de Representantes de los Pacientes del Northwestern Memorial Hospital al 312.926.3112, TDD/TTY 312.926.6363 y/o al Departamento de Representantes de los Pacientes del Northwestern Medical Group al 312.695.1100, TDD/TTY 312.926.6363.

Desarrollado por: NMH Interventional Radiology

©Junio de 2018 Northwestern Memorial HealthCare
900758 (6/18) Moderate Sedation in Interventional Radiology