

Información educativa para pacientes | Acerca de su medicamento

Dolutegravir (Tivicay®)

Dolutegravir es un medicamento para tratar el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o reducir el riesgo de contraer el VIH. Este medicamento siempre se debe tomar en combinación con otros medicamentos. Nunca debe tomarse solo.

Tome este medicamento exactamente como se le recetó, a la misma hora todos los días.

Cuándo y cómo tomarlo

Tome dolutegravir una vez al día. Tome este medicamento a la misma hora todos los días, a intervalos regulares.

Puede tomar este medicamento con o sin comida. Tome este medicamento con un vaso lleno de agua.

Olvidar una dosis

Es importante no olvidar ninguna dosis de dolutegravir. Olvidar una dosis aumentará el riesgo de contraer el VIH o generar resistencia a este medicamento.

Si olvida tomar una dosis de su medicamento, tómela tan pronto se acuerde, a menos que ya casi sea hora de su próxima dosis. Si ya es casi hora de su próxima dosis, omita la dosis que olvidó y siga el horario programado. Nunca tome una dosis doble o adicional de su medicamento.

Interacciones con otros medicamentos

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que toma en casa. Esto incluye otros medicamentos con receta, medicamentos de venta libre, plantas medicinales o suplementos. Algunos de éstos podrían interactuar con dolutegravir.

Dolutegravir interactúa con muchos suplementos de venta libre, como calcio, magnesio y hierro. Informe a su farmacéutico y médico si toma alguno de estos medicamentos. Ellos le indicarán cómo tomar estos medicamentos de forma segura.

Efectos secundarios

Dolutegravir may cause the following symptoms:

- › Diarrea
- › Náuseas
- › Vómitos
- › Mareos
- › Dolor de cabeza
- › Problemas para dormir

Informe a su médico si tiene diabetes. Dolutegravir podría elevar el nivel de azúcar en la sangre.

Cuándo llamar a su médico

Llame a su médico inmediatamente si se presenta alguno de los siguientes síntomas:

- › Reacción alérgica, que incluye erupción cutánea, urticaria, picazón o hinchazón de los labios, la lengua o la cara
- › Cambios de humor o cambios en el comportamiento
- › Temperatura corporal mayor a 100.4° F (38° C) o escalofríos

Para obtener más información sobre Northwestern Medicine, visite nuestro sitio web en nm.org.